

I

UNA NUEVA ESPECIE DE *STRATIOMYIA*
DE PERSIA

POR

S. V. PERIS TORRES

Estudiando los *Stratiomyiidae* del Instituto Español de Entomología he encontrado una *Stratiomyia*, del subgénero *Poecilothorax* Plsk. 1922, que al no poder incluir entre las formas descritas considero nueva.

Stratiomyia (Poecilothorax) persica n. sp.


♂.—Ignotus.

♀.—Oculis nudis. Antennis nigris, articulis primo secundoque ochraceo-nigris; articulo primo secundo fere ter longiore. Caput totam flavam, cum macula nigra triangularis in vertice. Protuberantia ocelligera nigra. Margine oculorum posteriore lato flavo. Parte capitis posteriore flava. Epistomate flavo, cum pilis argenteis tecto. Squamis occipitalibus flavis.

Thorace nigro tectoque pilis brevibus densisque albis; in parte media duas maculas flavas circulares; in parte lateralis, utroque, fasciis flavas, suturam transversam interruptas. Callis prealaris humeralibusque flavis. Scutello flavo. Metanotum niger.

Abdomine nigro. Segmento primo cum duas maculas laterales flavas. Segmento secundo cum duas maculas flavas, lateralis et triangularis, in parte media posteriore magis proximis. Segmento tertio cum maculas duas, in parte media dilatatis. In parte media segmenti macula flava linearibusque parva. Segmento

quarto maculas duas in partem mediam dilatatis et in margine posteriore inter se junctis. Segmento quinto: Macula una quadri-longa pro marginibus lateralibus distensa. Ventre toto flavo.



Stratiomyia (Poecilothorax)
persica n. sp.

Pedibus totis flavis; parte dorsale ultimis articuli tarsorum et unguis leviter rufis.

Alis hyalineis, venis crassioribus pallide aurantiacis. Halteribus flavis, capitulum ochraceo.

Long. corp.: 13,5 mm.

Long. alis: 9,5 mm.

Typus: ♀. Persia. Kouh Se-fi, Haut Karoum. VII-1899. Escalera leg.

Cabeza totalmente amarilla. Ojos lampiños. Primer artejo antenal unas tres veces el segundo. Los dos primeros son de color pardo más o menos negruzco; los restantes, negros. Epistoma y cara totalmente amarillos, con pilosidad blanco - plateada, el epistoma carece de toda línea más oscura. Protuberancia ocular negra, esta mancha se extiende por el vertex formando una mancha triangular, cuyos tres vértices están dispuestos de modo que los dos anteriores, truncados, casi

tocan los ojos, y el posterior llega hasta las placas occipitales; éstas, así como el borde que rodea los ojos, amarillos. Frente por la base de las antenas, de anchura igual a la altura del ojo. Partes bucales, amarillas; la trompa, con la labela algo testácea.

Tórax de colorido fundamental negro. En el noto, y lateralmente, una mancha amarilla a cada lado, que se extiende desde el escudete hasta cerca del callo humeral, e interrumpida en la sutura transversa. Sobre ésta, y en su parte media, dos manchas circulares amarillas, equidistantes de los lados. Callos humeral y prealar, amarillos. Escudete, amarillo; puntas de las espinas, negruzcas. Metanoto, negro. Pleuras y esternitos, amarillos; en

el externo, dos manchas negras, de bordes redondeados, que se extienden desde las coxas de las patas anteriores a las de las medias; estas manchas están próximas entre sí en la parte central, dejando una estrecha línea amarilla. Todo el tórax está cubierto de pilosidad blanca, más larga en las pleuras, y aterciopelada en el noto.

Abdomen superiormente negro y amarillo. Primer terguito con dos manchas laterales amarillas, apenas visibles desde arriba y acabadas en una punta central dirigida hacia la parte media. Segundo terguito con dos manchas laterales amarillas, triangulares, más próximas en su parte posterior. Tercer terguito con tres manchas: dos laterales, de tamaño normal, claviformes, con el ensanchamiento hacia la parte media del segmento y ligeramente prolongadas en su borde posterior; la otra mancha, en mitad del terguito, en su borde posterior, es linear, pequeña y muy finamente unida a las anteriores por el borde posterior del terguito, que es amarillo. Cuarto terguito con dos manchas laterales, de características iguales a las del anterior, pero claramente unidas entre sí por una banda. Quinto terguito con una mancha central, cuadrangular, con su mayor eje transversal y prolongada por los lados, bordeando el terguito amarillo. Vientre totalmente amarillo, más o menos sucio hacia la parte media y posterior. Patas totalmente amarillas en todas sus partes; tan sólo la parte superior del último artejo tarsal y uñas son ligeramente testáceos.

Alas hialinas; las venas mayores ligeramente amarillentas. Halterios amarillos, con la maza ocrácea.

El tipo ♀, y ejemplar único, procede del Alto Karum, en Persia, y fué cazado por el señor Escalera en la visita que hizo a aquellas regiones en 1899.

La presencia de las dos manchas circulares en el tórax, así como su vientre y epístoma, totalmente amarillos, separan esta forma de todas las conocidas.

Dentro del subgénero a que pertenece, se separa:

De *nobilis* Lw. 1870, por sus coxas totalmente amarillas, el vientre sin color negro y la ornamentación del tórax.

De *Str. brevicornis* Ports. 1887, se aproxima por su vientre amarillo, así como sus patas totalmente amarillas, y se separa por su epístoma inmaculado y las dos manchas circulares torácicas, que en *brevicornis* están reemplazadas por cuatro bandas.

